

ВИДИ РОДИНИ *POACEAE*, ОПИСАНІ З УКРАЇНИ: РОДИ *HELICTOTRICHON* BESSER, *HIEROCHLOË* R. BR., *KOELERIA* PERS., *LOLIUM* L., *MELICA* L., *MILIUM* L., *MOLINIA* SCHRANK, *PANICUM* L.

Ключові слова: таксономія, тип виду, базионім, голотип, лектотип, ізотип, *Poaceae*

Продовжуємо серію публікацій з типіфікації видів судинних рослин, описаних з території України. Ця стаття присвячена видам родини *Poaceae*: роди *Helictotrichon*, *Hierochloë*, *Koeleria*, *Lolium*, *Melica*, *Milium*, *Molinia* та *Panicum* — усього 20 таксонів.

Для кожного з них вказуються базионім, основна синоніміка, номенклатурний тип (цитовання протологу або голотипу, ізотипу, лектотипу або ізолектотипу) та автори таксона чи комбінації, а також місце зберігання типового гербарного зразка. В окремих випадках замість конкретного номенклатурного типу наводяться автентичні зразки. Тип подається за оригінальним описом на гербарній етикетці (зі збереженням старих назв адміністративних пунктів).

HELICTOTRICHON BESSER

1. *Helictotrichon tauricum* Prokud., 1950, Учен. зап. Харьк. унів., **32**: 198; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 158, pro syn. *H. compressum* (Heuff.) Henr.; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, **1**: 189, pro syn. *H. compressum* (Heuff.) Henr.

За протологом: «Habitat in silvis montanis. Typus speciei: “URSS, Tauria prope opp. Simeiz. 10.V.1916. Legit A.N. Petunnikov”»; in Herb. Horti Botanici Nikitensi conservatur».

Голотип. «*Avena pratensis* L. 2. Симеиз, Ялтинск[ий] у[езд], на полянах, 10 мая 1916. А.Н. Петунников» (*LE*).

Примітка. На цитованому типовому зразку (*LE*) є nota critica М.М. Цвельова, де зазначено: «holoturus vel isoturus». Окрім типу, Ю. Прокудін цитує також декілька автентичних зразків (specimina examinata) *Helictotrichon tauricum* з Криму: «1. Симферопольский уезд, на полянах. Петунников! 2. Симферопольский район, окрестности г. Симферополя, “Ливенские дубки”, поляны. 10.V.1926. Траншель! 3. Симферопольский

уезд. Лесная сторожка № 3 Курцовской казенной дачи близ дер. Аратук. 07.VI.1904. Траншель! 4. Симеиз, Ялтинского уезда, на полянах, 10.V.1916, Петунников! 5. Мисхор, парк. 25.V.1918. А. Смирнова! 6. Ялта, на сухой поляне. 06.VI. 1905. Юнге!».

У гербарії *YALT* зберігається ще один, імовірно, автентичний зразок з етикеткою: «*Avena pratensis*, Симеиз. Мисхорский парк, Ялтинск[ий] у[езд], 10 мая 1917. А.Н. Петунников», на якому написано «Турис», однак визнати його за такий неможливо, оскільки дата збору зразка інша (замість 1916 року — 1917, можливо, помилково).

HIEROCHLOË R. BR.

1. *Hierochloë stepporum* P. Smirn., 1958, Бюлл. Моск. общ. испыт. прир., сер. биол., **63**, 5: 81; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 238, pro syn. *H. repens* (Host) P. Beauv.; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, **1**: 239, pro syn. *H. repens* (Host) P. Beauv.

За протологом: «*Rossia austro-orientalis*. Prov. Stalingradensis, distr. Ssirotinskij, ad fontes Coeruleae flum. In declivitate septentrionali ad margines agrorum. Agropyretum, incultum. 16.V.1938, leg. P. Smirnov» (Herb. Univ. Mosq., *MW*).

Ізотип. «Верховье р. Голубой. По днищу лога Тепленького, бл[из] х[утора] Голубенького, 16 мая 1938, П.А. Смирнов» (*LE*).

Примітка. Голотип зберігається в гербарії Московського державного університету імені М.В. Ломоносова (*MW*). У гербарії *LE*, крім ізотипу, є ще один автентичний зразок, виділений П. Смирновим: «Верховье р. Голубой. Бл[из] х[утора] Теплого. Пырейная залежь по западному склону к балке Тепленькой. 8.V.1939, П. Смирнов».

KOELERIA PERS.

1. *Koeleria biebersteinii* M. Kaleniczenko ex Prokud., 1977, в Прокуд., Злаки Укр.: 194; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr. : 62.

За протологом: «Tauricum reservatum publicum, declivitas borealis Jailae Babugani, in locis lapidosis prope viam. 21.VI.1948, Prokudin (CWU)».

Топотип: «*Koeleria splendens* C. Presl, Бабуган-Яйла, склон г. Роман-Кош. — Jaila Babugan in declivibus m. Roman-Kosh. 20.VII.1948, № 770, Н. Цвелев» (LE, N. Fedoronchuk, L. Gubar; N. Tzvelev, in herb.).

Примітка. В гербаріях (CWU, KW, LE), де, ймовірно, міг би зберігатися тип, він не виявлений.

2. *Koeleria borysthenica* Klokov, 1950, Ботан. мат-лы (Ленинград), **12:** 53; Цвелев, 1970, Новости сист. высш. раст., 1971, **7:** 72, pro syn. *K. glauca* (Spreng.) DC. subsp. *sabuletorum* Domin (cum auct. *K. glauca* (Schrad.) DC.); Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, **1:** 207; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 197, pro syn. *K. sabuletorum* (Domin) Klokov.

За протологом: «RSS Укр., Borysthenis inferior prope Korsunj (monast. alt.) in arenis. 16.VI.1932, legit M. Klokov» («УССР, Нижний Днепр, окрестности Корсуня (б. монастырь), на песках, 16.06. 1932, собрал М. Клоков») (CWU).

Голотип. «УССР, Нижний Днепр, окрестности Корсуня (б. монастырь), на песках, 16.06.1932, собрал М. Клоков» (LE).

Примітка. Окрім голотипу, в гербарії LE зберігається виділений М. Цвельовим ще один автентичний зразок — паратип (Spec. authent.! Н. Цвелев, 1994), етикетка якого написана М. Клоковим «*Koeleria borysthenica* Klokov, УССР. Остров Хортица на Дніпре. Пески. 24.VI.1927, М. Клоков».

3. *Koeleria brevis* Steven, 1857, Bull. Soc. Nat. Moscou, **30,** 3: 110; Цвелев, 1970, Новости сист. высш. раст., 1971, **7:** 72; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, **1:** 206; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 196.

За протологом: «In Tauria campestri passim; eandem e campis maeoticis elatis versus Bachmut misit D. Graff».

Примітка. Лектотип, ймовірно, зберігається в Гельсинкі (H). У гербарії LE є зразок з етикеткою: «*Koeleria brevis* m. Campi maeotici. Steven, 1856», на якому зазначено «Cotypus!» і наведена літературна цитата з протолога. Однак в гербарії LE за лектотип («Lectotypus») М. Цвельов (02.1994 р.) з невідомих причин обрав інший гербарний зразок з етикеткою: «№ 3761, “*Koehleria*” (*Cluctylis lobata* MB. ... [“*Koehleria*”] *brevis*, Steven Verzeichn. Dedit Czerniajw. Tauria — Szudak. VI. 1832». Оскільки лектотип, обраний М. Цвельовим, не обнародований, а цитований нами гербарний зразок, на якому добре представлена рослина і місце збору майже повністю відповідає протологу, то ми вважаємо, що саме цей зразок можна розглядати як ізолектотип, якщо його дублікат міститься в гербарії H.

4. *Koeleria degenii* Domin, 1904, Mag. Bot. Lap. **3,** 8—11: 275; Domin, 1907, Monogr. Gatt. *Koeleria*: 74

(Icon.: l.c. tab. III, fig. 5; tab. IV, fig. 5 (Sudak, Trautvetter), fig. 6 (Odessa, Nordmann); Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, **1:** 206, pro syn. *K. brevis* Steven; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 196, pro syn. *K. brevis* Steven.

За протологом: «Habitat in Romania orient.».

Лектотип: «*Dactylis lobata* M.B. Nordmann: H. Odessana» (LE, M. Fedoronchuk, hoc loco).

Примітка. Вид описаний за протологом із «Східної Румунії». У монографії, присвяченій роду *Koeleria* Parl. й опублікованій на три роки пізніше першоопису виду, наведені рисунки рослин, взяті з гербарних зразків, зібраних із Судака (колектор Р.Е. Траутфеттер) та з Одеси (колектор А. Нордманн). На сьогодні, ймовірно, вид не лектотипіфікований. У гербарії LE зберігається зразок, зібраний Нордманном з Одеси, який використаний К. Доміном для рисунка в монографії. Саме цей зразок ми й обрали за лектотип.

5. *Koeleria delavignei* Czern. ex Domin, 1907, Biblioth. Bot. (Stuttgart), **65:** 247; Цвелев, 1970, Новости сист. высш. раст., 1971, **7:** 68; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, **1:** 204; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 188. — *K. delavignei* Czern., 1859, Consp. Pl. Charcov: 73, nom. nudum. — *K. vigneana* Czern., in herb.

За протологом: «Habitat in graminosis, pratis inundatis subhumidis per Rossiam meridionalem et orientalem». Icon.: tab. XVII, fig. 1, 2. Distribution geographica: «In pratis inundatis per totam Ucraniam, leg. Czerniaëv sub nom. *Koeleria vigneana* Czern. (= *Koeleria delavignei* Czern.): Gub. Charkov: pr. Wodianoe (Reinhard, 1879, Czerniaëw). In pratis silvaticis ad Krasnaja Poliana (Reinhard, 1879)...».

Лектотип. «*Koeleria vigneana* Czern. (= *Koel.[leria]* “*delavignii*” Czern., Consp. Pl. Charc. [...]. In pratis inundatis per totam Ucraniam, leg. Czerniaëv» (LE, M. Fedoronchuk, hoc loco; in herb. LE sub nom. «isotypus»).

Примітка. За лектотип обраний гербарний зразок, який зберігається в LE як ізотип (імовірно, виділений М. Цвельовим). Надання цьому зразку статусу «ізотип» можна пояснити тим, що автор його виділення вважав за можливе зберігання оригіналу в гербарії В. Черняєва (KW). Під час дослідження гербарних зразків у колекції В. Черняєва з'ясувалося, що даний автентичний екземпляр відсутній, натомість є низка інших гербарних зразків, які можна вважати за автентичні, зібраних В. Черняєвим: *Koeleria vigneana* Czern. (*delavignei* Consp.). Куряжь и Харьков. № 59; *Koeleria*, Куряжь, 1.VI.1856, № 60; *Koeleria delavignei* Czern. “... in pratis Kurjag”, 1.VI.1856; *Koeleria delavignei*, между Тернавой и г. Чугуевым, 29.V.1854, № 49 (виділений як різновид f. *longifolia*); *Koeleria delavignei*, Ветровка, 27.V.1868, № 58; Между Тернавой и г. Чугуевым, 29.V.1854, № 49. Оскільки зразок в LE уже виділений раніше, але не обнародований, ми визнаємо його за лектотип, а всі інші зразки, які є в гербарії KW, — автентичними.

6. *Koeleria robusta* (Pacz. ex Schmalh.) Janata, 1916, Тр. Ест.-ист. муз. Тавр. губ. земства, 4: 66; Цвелев, 1970, Новости сист. высш. раст., 1971, 7: 72, pro syn. *K. lobata* (M. Bieb.) Roem. et Schult.; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, 1: 206, pro syn. *K. lobata* (M. Bieb.) Roem. et Schult. — *K. cristata* s. *robusta* Pacz. ex Schmalh. 1897, Фл. Средн. и Южн. Росс. 2: 629.

За протоологом: «Крым (Феодосия П[ачоский]! голая форма), Кавк.[аз] (Бештау Ак[инфиев]!), Закавказье (Бл. Боржома Ак[инфиев]!)».

Лектотип: «*Koeleria cristata* var.? forma *robusta*. Theodosia (Tauria). 19.VI.1889, Paczoski» (*LE*, M. Fedoronchuk, L. Gubar, hoc loco; Н. Цвелев, 2008, in herb. *LE*; изолектотип — *KW*).

Примітка. На гербарному зразку є nota critica М. Цвельова (*Isotypus vel typus?*).

7. *Koeleria sabuletorum* (Domin) Klokov, 1950, Ботан. мат.-лы (Ленинград), 12: 55; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 197. — *K. glauca* (Spreng.) DC. subsp. *sabuletorum* Domin, 1907, Biblioth. Bot. (Stuttgart), 65: 65; Цвелев, 1970, Новости сист. высш. раст., 1971, 7: 72; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, 1: 207. — *K. sabuletorum* Czern., 1859, Consp. fl. Charcov.: 73, nom. nudum.

За протоологом: «Habitat in sabulosus Rossiae australis (Ucrainiae)»;

Лектотип: «(*Elymus?*) *Koeleria*. Tchernjef. In sabuletis ad fluvium Piskovatka. (Казанская станица в 20 верстах от Дона)» (*LE*, M. Fedoronchuk, L. Gubar, hoc loco).

Примітка. Підготовлений до опису В. Черняєвим вид на основі його власних зборів із Краснодарського краю (Дону), суміжного з сучасною територією України, був валідизований К. Доміном у статусі підвиду *Koeleria glauca* (Spreng.) DC. subsp. *sabuletorum* Domin. Автентичні зразки виду, що тепер зберігаються в гербарії *LE*, які були вилучені з колекції В. Черняєва (*KW*), розміщені на шести гербарних аркушах, один із них ми обрали за лектотип.

8. *Koeleria sclerophylla* P. Smirn. subsp. *theodoriana* Klokov ex Tzvelev, 1970, Новости сист. высш. раст., 1971, 7: 72; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, 1: 206; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 194, in adnot ad *K. lobata* (M. Bieb.) Roem. et Schult. — *K. sclerophylla* subsp. *theodoriana* Klokov, in litt. — *K. theodoriana* Klokov, 1950, Визн. рослин УРСР: 877, descr. ucr.

За протоологом: «Ukraina, prov. Donetz, distr. Slavjansk, pag. Majaki, 05. VI. 1939, F. Grinj et D. Dobroczaeva». «УССР, Донецкая обл., Славянский р-н,

с. Маяки. На степных склонах, 05.VI.1939. Собрал Ф. Гринь и Д. Доброчаева».

Голотип. «УССР, Донецкая обл., Славянский р-н, с. Маяки. На степных склонах, 05.VI.1939. Собрал Ф. Гринь и Д. Доброчаева» (*LE*, голотип, ізотип).

9. *Koeleria talievii* Lavrenko, 1940, Фл. УРСР, 2: 215; Цвелев, 1970, Новости сист. высш. раст., 1971, 7: 72; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, 1: 206; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 191.

За протоологом: «На крейдяних відслоненнях у басейні Дінця. Д. Л.-С. Ворошиловградська обл.: Лисичанський р-н, с. Серебрянка, крейдяне відслонення; на гумусуватому крейдяному ґрунті по верху схилу (“лоб” схилу) правого берега долини р. Дінця (26. V. 1918. Талієв і Лавренко !!). — Л.З.-Л.С. Ворошиловградська обл.: Рубіжанський р-н, околиці Дворічної (Лавренко!); басейн р. Оскола, хут. Єржов по р. Верхній Дворічній, крейдяні відслонення (2.IX.1922; плоди осипались, !!). Нижньодуванський р-н, с. Верхня Дуванка (басейн р. Красної), крейдяні відслонення по правому схилу зі східної експозиції долини р. Дуванки (11.IX.1922; плоди осипались, !!)» (*KW*).

Топотип: «*Koeleria gracilis* Pers. var. *rossica* Domin. Донецька обл. Лисичанськ[ий] р[ион] с. Серебрянка крейдяні схили. 13. VII. 1936, leg. Ф. Гринь та О. Романова. Determ. Ф. Гринь» (*KW*, M. Fedoronchuk, L. Gubar, hoc loco).

Примітка. У гербарних матеріалах (*LE*, *KW*, *CWU*) цитованих у протолозі типових зразків не виявлено. Можливо, в результаті детальніших пошуків буде виділений неотип. Серед зразків *Koeleria talievii* в гербарії *KW* знайдено один із них, який можна вважати топотипом.

10. *Koeleria taurica* M. Kaleniczenko, 1986, Ботан. журн., 71, 1: 91; Черепанов, 1981, Сосуд. раст. СССР: 365; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 63.

За протоологом: «Tauria, Babugan-Jailae declivitas boreali-occidentalis in viciniis castelli Alabacz, 17. VI.1963, M. Kaleniczenko (Herbarium Universitatis Charkoviensis); Крым, сев.-зап. склон Бабуган-яйлы в окр. Кордона Алабач, 17.VI.1963, М. Калениченко (Гербарий Харьковского университета)».

Примітка. Типовий матеріал, можливо, втрачений, у гербаріях *LE*, *KW*, *CWU*, *YALT* він відсутній.

LOLIUM L.

1. *Lolium marschallii* Steven, 1857, Bull. Soc. Nat. Moscou, 30, 3: 103; Шмальг., 1897, Фл. Ср. и Южн.

Росс., 2: 653; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, 1: 270, pro syn. *L. perenne* L.; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 321, pro syn. *L. perenne* L.

За протологом: «In Tauria meridionali».

Ізолектотип? «*Lolium tenue*. Taur. merid.» (Tzvelev, 09.X.1969, in herb., pro lectotypus).

Примітка. Лектотип, імовірно, зберігається в Гельсинкі (*H*).

MELICAL.

1. *Melica chrysolepis* Klokov, 1947, Ботан. журн. АН УРСР, 4, 1—2: 93; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 396; Цвелев, 1973, Новости сист. высш. раст., 10: 85, pro syn. *M. ciliata* L. subsp. *ciliata*, quoad typo; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, 1: 318, pro syn. *M. ciliata* L. subsp. *ciliata*, quoad typo.

За протологом: «RSS Ucr., dit. Staliniensis, distr. Luxemburg, prope st. Rosovka. In graniticis Bestashgora vel Kamjani Mohyly dictis. 1934. In Herb. In-ti Bot. Ac. Sc. RSS Ucr. conservatur» (*KW*).

Примітка. В гербарії *KW* типовий матеріал відсутній, імовірно, він зберігається в *LE*, про що свідчить примітка М. Цвельова (1973, цит. літ.) до підвиду *Melica transsilvanica* Schur subsp. *klokovii* Tzvelev, де він зазначає, що «тип или изотип» зберігається в Ленінграді.

2. *Melica monticola* Prokud., 1948, Тр. Никитск. ботан. сада., 25, 1—2: 129; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 398; Прокуд., 1951, в Е. Вульф, Фл. Крима, т. 1, вип. 4: 71, pro syn. *M. taurica* K. Koch subsp. *monticola* (Prokud.) Prokud.; Цвелев, 1972, Список раст. Герб. Фл. СССР, XIX: 53, pro syn. *M. ciliata* L. subsp. *monticola* (Prokud.) Tzvelev; Цвелев, 1973, Новости сист. высш. раст., 10: 85, pro syn. *M. ciliata* L. subsp. *monticola* (Prokud.) Tzvelev; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, 1: 270, pro syn. *M. ciliata* L. subsp. *monticola* (Prokud.) Tzvelev.

За протологом: «Habitat: Jaila et rarius lac is saxosis atque apertis superiori Zonaе montanae. Typus species: "Tauria. Kemal-Egerek, rupes. 4.VIII. (22.VII.) 1907. Leg. Wankow". In herbario horti Botanici Nikitensis Conservatur».

Голотип. «*Melica ciliata* L. var. *micrantha* Boiss. Кемаль-Эгerek; скалы. 4.VIII. (22.VII.) 1907. I. Wankow» (*YALT*).

Примітка. Серед численних автентичних зразків автор цитує також вищенаведений типовий зразок («*Tyrus species*»). На типовому зразку є дві потае критісае. На одній із них рукою Ю. Прокудіна написано: «*M. monticola* mihi, 21.VIII.1946. Ю. Прокудін», на іншій — «*Tyrus species. Melica monticola* Prokudin, 2.II.1947. Ю. Прокудін».

3. *Melica taurica* K. Koch, 1848, Linnaea, XXI: 395; Лавренко, 1934, Фл. СССР, 2: 346; Прокуд., 1951, в Е. Вульф, Фл. Крима, т. 1, вип. 4: 69; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 398. — *M. ciliata* L. subsp. *taurica* (K. Koch) Tzvelev, 1972, Список раст. Герб. Фл. СССР, XIX: 53; Цвелев, 1973, Новости сист. высш. раст., 10: 85; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, 1: 318.

За протологом: «Aut Thonschiefer, Grünstein und Jurakalk der Südküste der Krim bis zu 2000' Höhe».

Неотип. «*Melica taurica* C. Koch. Крым. С. Родниковское (Скеля). Склоны с можжевельново-грабникового лесом. 13 августа 1968 г. Собр. А.Е. Бобров, В.Н. Сипливинский, Т.И. Заиконникова, Т.П. Хорт» (*LE*, М. Fedoronchuk, L. Gubar, hoc loco; Tzvelev, 15.06.2003, pro neotypus! in herb.).

Примітка. Типовий матеріал відсутній. Неотип виділений М.М. Цвельовим, що засвідчує його почерк на nota critica: «*Melica taurica* C. Koch. Neotypus! 15.06.2003».

4. *Melica transsilvanica* Schur subsp. *klokovii* Tzvelev, 1972, Список раст. Герб. Фл. СССР, XIX: 53; Цвелев, 1973, Новости сист. высш. раст., 10: 84; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, 1: 318; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 397, pro syn. *M. chrysolepis* Klokov.

За протологом: «Ucraina, distr. Bachmut, pag. Serebrjanka, 24.VI.1896, O. Alexeenko» (*LE*).

Голотип. «Prov. Ekaterinoslav, distr. Bachmut, pag. Serebrjanka, 24.VI.1896, O. Alexeenko» (*LE*).

5. *Melica viridiflora* Czern., 1859, Consp. Fl. Charcov.: 73; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, 1: 317, pro syn. *M. picta* K. Koch. — *M. nutans* L. var. *viridiflora* Ledeb. in Hb[herb.] Turcz[aninov] ([*KW*]).

За протологом: «Ch[arkow]».

Лектотип. «*Melica viridiflora* Czern. m. Charcovia (Kharcow). Det. В.М. Czerniaiew» (*LE*; М. Fedoronchuk, L. Gubar, hoc loco; N. Tzvelev, in herb. VIII. 2011).

MILIUM L.

1. *Milium vernale* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc. I: 53; Шмальг., 1897, Фл. Средн. и Южн. Росс., 2: 598; Рожевиц, 1934, Флора СССР, 2: 119; Лавренко, 1940, Фл. УРСР, 2: 134; Прокуд., 1951, в Е. Вульф, Фл. Крима, 1, 4: 31; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, 1: 217; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 210.

За протологом: «Habitat in Tauriae et Caucasi subalpini collibus. Floret Aprili».

Лектотип. «Caucasus» (*LE*, М. Fedoronchuk, L. Gubar (hoc loco); N. Tzvelev, in herb.).

Примітка. Вид описаний на основі гербарних зразків, зібраних із Криму та Кавказу. За лектотип обраний зразок з Кавказу («Caucasus»), який зберігається в колекції Ф.А. Маршалла Біберштейна (*LE*).

MOLINIA SCHRANK

1. *Molinia euxina* Pobed., 1949, Ботан. мат-лы (Ленинград), **11**: 36; Клоков, 1950, Визн. рослин УРСР: 874; Прокуд., 1977, Злаки Укр.: 435; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 64; Цвелев, 1974, Фл. европ. ч. СССР, **1**: 339, pro syn. *M. caerulea* (L.) Moench.

За протологом: «Ukraina, mare Euxinum, insula Dschalyrgacz, 3 km versus S-O a puteo Sredni, prope puteum Dschavoroniczi, 15.09.1947, N 371, leg. E. Pobedimova» («Украинская ССР. Остров Джарылгач, в 3 км к юго-востоку от колодца Среднего, почти против колодца Жавороночи, в низинке около ив, близ открытого моря, 15.IX.1947, N 371, собр. Е.Г. Победимова») (*LE*).

Голотип. «*Molinia euxina* Pobed. sp. n. Остров Джарылгач, в 3 км к юго-востоку от колодца Среднего, почти против кол.[одца] Жавороночи, в низинке около ив, близ открытого моря, 15.IX.1947, собр. Е. Победимова (№ 371)» (*LE*; изотипи (2)).

PANICUM L.

1. *Panicum arenarium* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., **1**: 52; Чер., 1981, Сосуд. раст. СССР: 370, pro syn. *Digitaria ischaetum* (Schreb.) Muehl.

За протологом: «Habitat in glareosis ad torrentem Podkumok Caucasi, prope castellum Georgopolitanum: etiam in arena mobili prope Kiew et Charkow. Floret aestata» (*LE*).

Примітка. Вид описаний на основі гербарних зразків, зібраних з Кавказу та околиць Києва і Харкова. Лектотип, імовірно, не виділений, зберігається в колекції Ф.А. Маршалла Біберштейна (*LE*).

Рекомендує до друку
Д.В. Дубина

Надійшла 30.01.2013 р.

Н.М. Федорончук¹, Л.М. Губарь¹, О.А. Футорна^{1,2}

¹ Інститут ботаники імені Н.Г. Холодного НАН України, г. Київ

² НІЛ «Ботанический сад» Ботанического сада імені А.В. Фомина ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВИДЫ СЕМЕЙСТВА POACEAE, ОПИСАННЫЕ ИЗ УКРАИНЫ: РОДЫ *HELICTOTRICHON* BESSER, *HIEROCHLOË* R. BR., *KOELERIA* PERS., *LOLIUM* L., *MELICA* L., *MILIUM* L., *MOLINIA* SCHRANK, *PANICUM* L.

Приведен список видов семейства *Poaceae* (роды *Helictotrichon*, *Hierochloë*, *Koeleria*, *Lolium*, *Melica*, *Milium*, *Molinia*, *Panicum*), описанных с территории Украины, осуществлена типификация большинства видов. Для каждого вида указаны основная синонимика, номенклатурный тип (по протологу и голотип, лектотип, изотип, неотип или топотип), автор его выделения и место хранения.

Ключевые слова: таксономия, тип вида, бационим, голотип, лектотип, изотип, *Poaceae*.

М.М. Fedoronchuk¹, L.M. Gubar¹, O.A. Futorna^{1,2}

¹ M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

² O.V. Fomin Botanical Garden, Educational-Scientific Centre «Institute of Biology», National Taras Schevchenko University of Kyiv

SPECIES OF THE FAMILY POACEAE DESCRIBED FROM UKRAINE: GENERA *HELICTOTRICHON* BESSER, *HIEROCHLOË* R. BR., *KOELERIA* PERS., *LOLIUM* L., *MELICA* L., *MILIUM* L., *MOLINIA* SCHRANK, *PANICUM* L.

The list of species of vascular plants of the family *Poaceae* (genera *Helictotrichon*, *Hierochloë*, *Koeleria*, *Lolium*, *Melica*, *Milium*, *Molinia*, *Panicum*) described from Ukraine and typification of some species are provided. The following data for each species are provided: basionym, original nomenclatural citation; type according to the protologue, and holotype, isotype, lectotype, neotype, or topotype; herbarium(-a) in which the specimen(s) is (are) deposited.

Key words: taxonomy, type specimens, basionim, holotype, lectotype, isotype, *Poaceae*.